



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
69<sup>ος</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
“Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

**Β΄ τάξη Γυμνασίου**

**Πρόβλημα 1.**

Αν ισχύει ότι  $4x - 5y = 10$ , να βρείτε την τιμή της παράστασης

$$A = (4x + 5y) - 36x + 35y + (8 : 4 - 2)^2.$$

**Λύση**

Η παράσταση γίνεται:

$$\begin{aligned} A &= (4x + 5y) - 36x + 35y + (8 : 4 - 2)^2 \\ &= 4x + 5y - 36x + 35y + (2 - 2)^2 \\ &= -32x + 40y + 0^2 = -8(4x - 5y) + 0 = -8 \cdot 10 = -80. \end{aligned}$$

**Πρόβλημα 2**

Τρίγωνο  $AB\Gamma$  έχει πλευρές  $AB = 3x - 2$ ,  $B\Gamma = x + 12$  και  $\Gamma A = 2x + 8$ ,  $x \geq 2$ . Να βρείτε τις τιμές του  $x$  για τις οποίες το τρίγωνο  $AB\Gamma$  είναι ισοσκελές. Υπάρχει τιμή του  $x$  για την οποία το τρίγωνο  $AB\Gamma$  είναι ισόπλευρο;

**Λύση**

Το τρίγωνο  $AB\Gamma$  είναι ισοσκελές, αν ισχύει:

$$\begin{aligned} AB = B\Gamma \text{ ή } AB = A\Gamma \text{ ή } A\Gamma = B\Gamma \\ \Leftrightarrow 3x - 2 = x + 12 \text{ ή } 3x - 2 = 2x + 8 \text{ ή } 2x + 8 = x + 12 \\ \Leftrightarrow 2x = 14 \text{ ή } x = 10 \text{ ή } x = 4 \Leftrightarrow x = 7 \text{ ή } x = 10 \text{ ή } x = 4. \end{aligned}$$

Από τη λύση των παραπάνω εξισώσεων διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει τιμή του  $x$  που να επαληθεύει την ισότητα  $AB = B\Gamma = A\Gamma$ , οπότε το τρίγωνο  $AB\Gamma$  δεν μπορεί να είναι ισόπλευρο.

**Πρόβλημα 3**

Δίνεται ορθογώνιο  $AB\Gamma\Delta$  με πλευρές  $AB = \Gamma\Delta$  και  $A\Delta = B\Gamma$  μήκους  $\alpha$  και  $\beta$ , αντίστοιχα. Αν αυξήσουμε το μήκος  $\alpha$  κατά 20% και το μήκος  $\beta$  κατά 30%, να βρεθεί πόσο επί τοις εκατό θα αυξηθεί το εμβαδόν του ορθογωνίου.

**Λύση**

Το εμβαδόν του ορθογωνίου  $AB\Gamma\Delta$  είναι  $E = \alpha\beta$ . Μετά την αύξηση του μήκους των πλευρών του τα μήκη των πλευρών του νέου ορθογωνίου είναι:

$$\alpha' = \alpha + \frac{20\alpha}{100} = \alpha + \frac{2\alpha}{10} = \frac{12\alpha}{10} \text{ και } \beta' = \beta + \frac{30\beta}{100} = \beta + \frac{3\beta}{10} = \frac{13\beta}{10}.$$

Έτσι το εμβαδόν του νέου ορθογωνίου θα είναι:

$$E' = \frac{12\alpha}{10} \cdot \frac{13\beta}{10} = \frac{156\alpha\beta}{100} = \alpha\beta + \frac{56\alpha\beta}{100} = E + \frac{56\alpha\beta}{100}$$

$$\Rightarrow E' - E = \frac{56E}{100} \Rightarrow \frac{E' - E}{E} = \frac{56}{100}.$$

Άρα η αύξηση της τιμής του εμβαδού είναι 56% πάνω στην αρχική τιμή του.


#### Πρόβλημα 4

Δίνεται τρίγωνο  $AB\Gamma$  ( $A\Gamma > AB$ ) με τη γωνία  $\hat{A}$  διπλάσια της γωνίας  $\hat{B}$  και τη γωνία  $\hat{B}$  μεγαλύτερη από τη γωνία  $\hat{\Gamma}$  κατά είκοσι μοίρες. Δίνονται ακόμα το ύψος του  $AH$  και η διχοτόμος του  $A\Delta$ .

(α) Αν  $A', B', \Gamma'$  είναι τα συμμετρικά των κορυφών  $A, B, \Gamma$  του τριγώνου  $AB\Gamma$ , ως προς άξονα συμμετρίας την ευθεία του ύψους  $AH$ , να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα  $ABB'$  και  $A\Gamma\Gamma'$  είναι ισοσκελή και να βρείτε τις γωνίες τους.

(β) Να βρείτε τη γωνία που σχηματίζεται από το ύψος  $AH$  και τη διχοτόμο  $A\Delta$ .

#### Λύση



(α) Από την υπόθεση έχουμε  $\hat{A} = 2\hat{B}$  και  $\hat{\Gamma} = \hat{B} - 20^\circ$ , οπότε από τη γνωστή ισότητα  $\hat{A} + \hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$  λαμβάνουμε  $2\hat{B} + \hat{B} + \hat{B} - 20^\circ = 180^\circ \Leftrightarrow 4\hat{B} = 200^\circ \Leftrightarrow \hat{B} = 50^\circ$ .

Άρα έχουμε και  $\hat{A} = 100^\circ$  και  $\hat{\Gamma} = 30^\circ$ .

Λόγω συμμετρίας ως προς τον άξονα  $AH$ , τα τρίγωνα  $AB\Gamma$  και  $AB'\Gamma'$  είναι ίσα ( $A' \equiv A$ , αφού το σημείο  $A$  ανήκει στον άξονα συμμετρίας), οπότε θα έχουν τις αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, δηλαδή  $AB = AB'$  και  $A\Gamma = A\Gamma'$ . Άρα τα τρίγωνα  $ABB'$  και  $A\Gamma\Gamma'$  είναι ισοσκελή.

Επιπλέον έχουμε

$$\hat{B}' = \hat{B} = 50^\circ, \hat{\Gamma}' = \hat{\Gamma} = 30^\circ,$$

$$\hat{B}\hat{A}\hat{B}' = 180^\circ - 2 \cdot 50^\circ = 80^\circ \text{ και } \hat{\Gamma}'\hat{A}\hat{\Gamma} = 180^\circ - 2 \cdot 30^\circ = 120^\circ.$$

(β) Από το ορθογώνιο τρίγωνο  $AH\Delta$  έχουμε την ισότητα:

$$\hat{H}\hat{A}\hat{\Delta} = 90^\circ - \hat{A}\hat{\Delta}\hat{H} \quad (1)$$

Όμως από το τρίγωνο  $AB\Delta$  λαμβάνουμε την ισότητα:

$$\hat{A}\hat{\Delta}\hat{H} = \hat{A}\hat{\Delta}\hat{B} = 180^\circ - \hat{B} - \hat{\Delta}\hat{A}\hat{B} = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ. \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$\hat{H}\hat{A}\hat{\Delta} = 90^\circ - 80^\circ = 10^\circ.$$