



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
77^{ος} ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ “Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”
28 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

(α) Να βρεθούν όλα τα μη μηδενικά κλάσματα $\frac{\alpha}{\beta}$, με α, β μη αρνητικούς ακέραιους και $\alpha + \beta = 4$.

(β) Για το μικρότερο από τα κλάσματα του προηγούμενου ερωτήματος να βρείτε την τιμή της παράστασης: $A = \left(2 + \frac{\alpha}{\beta}\right) \cdot \frac{6}{7} - 3 \left(\frac{2 \cdot \alpha}{\beta} - \frac{9}{27}\right)$.

Λύση

(α) Αφού το κλάσμα $\frac{\alpha}{\beta}$ είναι μη μηδενικό πρέπει $\alpha \neq 0$ και αφού το β είναι παρονομαστής πρέπει $\beta \neq 0$. Αφού α, β είναι μη αρνητικοί ακέραιοι και $\alpha + \beta = 4$ πρέπει να ισχύει $\alpha < 4$ και $\beta < 4$. Επομένως, έχουμε:

$$\alpha = 3, \beta = 1, \frac{\alpha}{\beta} = 3, \quad \alpha = 2, \beta = 2, \frac{\alpha}{\beta} = 1 \quad \text{και} \quad \alpha = 1, \beta = 3, \frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{3}.$$

(β) Το μικρότερο από τα κλάσματα που βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα είναι το $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{1}{3}$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \left(2 + \frac{\alpha}{\beta}\right) \cdot \frac{6}{7} - 3 \left(\frac{2 \cdot \alpha}{\beta} - \frac{9}{27}\right) = \left(2 + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{7} - 3 \left(\frac{2 \cdot 1}{3} - \frac{9}{27}\right) \\ &= \frac{7}{3} \cdot \frac{6}{7} - 3 \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right) = 2 - 1 = 1. \end{aligned}$$

Πρόβλημα 2

Ο θετικός ακέραιος A έχει το γινόμενο των ψηφίων του ίσο με 12, το άθροισμα των ψηφίων του ίσο με 9 και επιπλέον διαιρείται με το 4. Να βρείτε τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή του A .

Λύση

Επειδή είναι $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ τα δυνατά ψηφία του A , έτσι ώστε αυτά να έχουν άθροισμα 9 είναι τα εξής:

(α) 2,6,1 (τριψήφιος αριθμός)

(β) 3,4,1,1 (τετραψήφιος αριθμός)


(γ) 2,2,3,1,1 (πενταψήφιος αριθμός)

Η μικρότερη δυνατή τιμή μπορεί να προκύψει από την περίπτωση (α). Δεδομένου ότι ένα αριθμός διαιρείται με το 4, όταν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4, οι δυνατές τιμές του A είναι οι 216 και 612. Επομένως η μικρότερη δυνατή τιμή του A είναι **216**.

Η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του A μπορεί να προκύψει από την περίπτωση (γ). Δεδομένου ότι ένα αριθμός διαιρείται με το 4, όταν το τελευταίο διψήφιο τμήμα του διαιρείται με το 4, οι δυνατές τιμές του A πρέπει να έχουν τελευταίο διψήφιο τμήμα το 12 ή το 32. Όμως για τον προσδιορισμό της μεγαλύτερης δυνατής τιμής του A πρέπει το πρώτο ψηφίο του να είναι το 3. Επομένως η μεγαλύτερη δυνατή τιμή του A είναι **32112**.

Πρόβλημα 3

Δίνεται τετράγωνο ABΓΔ πλευράς α. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ κατά τμήμα ΔΕ = ΒΔ και την πλευρά ΓΔ κατά τμήμα ΔΖ = ΒΔ.




(α) Να βρείτε πόσες μοίρες είναι οι γωνίες $\hat{\Delta}BE$ και $\hat{\Delta}ZB$.

(β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ΑΓ και ΕΖ είναι παράλληλες.

Σημείωση: Στην κόλλα σας να κάνετε το δικό σας σχήμα.

Λύση



Σχήμα 1

(α) Επειδή $AE \parallel B\Gamma$ και τέμνονται από την ευθεία BE έχουν τις εντός εναλλάξ γωνίες του ίσες, δηλαδή

$$\hat{B}_1 = \hat{E}_1 \quad (1)$$

Επειδή από υπόθεση $\Delta E = \Delta B$, το τρίγωνο ΔBE είναι ισοσκελές και έχει:

$$\hat{\Delta}BE = \hat{B}_2 = \hat{E}_1 \quad (2)$$

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει η ισότητα:

$$\hat{\Delta}BE = \hat{B}_2 = \hat{B}_1 \quad (3)$$

Επειδή το τρίγωνο $\Delta B\Gamma$ είναι ορθογώνιο ισοσκελές ($B\Gamma = \Gamma\Delta$, $\hat{\Gamma} = 90^\circ$) θα έχουμε:

$$\Gamma\hat{B}\Delta \equiv \hat{B}_1 + \hat{B}_2 = 45^\circ \stackrel{(3)}{\Rightarrow} 2 \cdot \Gamma\hat{B}\Delta = 45^\circ \Rightarrow \Gamma\hat{B}\Delta = 22,5^\circ$$

Με το ίδιο σκεπτικό όπως προηγουμένως έχουμε ότι $\hat{B}_3 = \hat{Z}_1$, αφού $\Delta B = \Gamma Z$, $\hat{B}_4 = \hat{Z}_1$, αφού $AB \parallel \Gamma Z$. Επίσης είναι $A\hat{B}\Delta = \hat{B}_3 + \hat{B}_4 = 45^\circ$, οπότε λαμβάνουμε τελικά $\Delta\hat{Z}B = \hat{Z}_1 = 22,5^\circ$.

(β) Επειδή τα τρίγωνα $\Delta\Gamma A$ και $\Delta E Z$ είναι ορθογώνια ισοσκελή θα έχουμε $\Delta\hat{A}\Gamma = \Delta\hat{E}Z = 45^\circ$, οπότε οι ευθείες $A\Gamma$ και $E Z$ τεμνόμενες από την ευθεία $A E$ σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. Επομένως οι ευθείες $A\Gamma$ και $E Z$ είναι παράλληλες.

Πρόβλημα 4

Ένας πεζοπόρος περπατάει από το χωριό A για να πάρει το τρένο στην πόλη B . Ο πεζοπόρος σε μία ώρα προχώρησε κατά 4 χιλιόμετρα και τότε διαπίστωσε ότι περπατώντας με αυτή την ταχύτητα θα έφθανε στο σταθμό μία ώρα αργότερα από την αναχώρηση του τρένου. Για αυτό το λόγο στο υπόλοιπο της διαδρομής κινήθηκε με 6 χιλιόμετρα την ώρα και έτσι έφθασε στο σταθμό μισή ώρα νωρίτερα από την αναχώρηση του τρένου. Να βρείτε την απόσταση του χωριού A από το σταθμό του τρένου στη πόλη B .

Λύση

Έστω ότι η απόσταση του χωριού A από το σταθμό του τρένου στη πόλη B είναι x χιλιόμετρα. Με την ταχύτητα που έτρεχε ο πεζοπόρος θα κάλυπτε την απόσταση σε $\frac{x}{4}$ ώρες, οπότε η ώρα που ξεκινούσε από το χωριό A και η ώρα

αναχώρησης του τρένου διέφεραν κατά $\frac{x}{4} - 1$ ώρες.

Μετά την πρώτη ώρα ο χρόνος που είχε ο πεζοπόρος για να φθάσει έγκαιρα στο σταθμό ήταν $\left(\frac{x}{4} - 1\right) - 1 = \frac{x}{4} - 2$ ώρες. Τα χιλιόμετρα που απέμεναν ήταν $x - 4$

και για να τα καλύψει ο πεζοπόρος χρειάστηκε $\frac{x - 4}{6}$ ώρες. Σύμφωνα με την υπόθεση θα έχουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} \frac{x}{4} - 2 - \frac{x - 4}{6} &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x}{4} - \frac{x - 4}{6} = \frac{1}{2} + 2 \Leftrightarrow \frac{x}{4} - \frac{x - 4}{6} = \frac{5}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{3x}{12} - \frac{2x - 8}{12} &= \frac{30}{12} \Leftrightarrow 3x - (2x - 8) = 30 \Leftrightarrow 3x - 2x + 8 = 30 \Leftrightarrow x = 22. \end{aligned}$$

Επομένως η απόσταση του χωριού A από το σταθμό του τρένου στη πόλη B ήταν 22 χιλιόμετρα.

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Πρόβλημα 1

Να βρείτε την τιμή της παράστασης

$$A = \frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3}{\alpha\beta\gamma}, \text{ αν δίνεται ότι } \alpha = \left(-\frac{2}{3}\right)^{-4}, \beta = \left(-\frac{3}{2}\right)^3, \gamma = -\frac{27}{16}.$$