

του είχαν απομείνει. Αν και τις δύο μέρες ξόδεψε συνολικά 40 ευρώ, να βρεθεί πόσα κέρματα των δύο ευρώ είχε αρχικά μαζί του..

### Λύση

Έστω  $x$  τα κέρματα των δύο ευρώ που είχε αρχικά. Αφού χρησιμοποίησε το ένα τρίτο αυτών,

σημαίνει ότι το  $x$  είναι πολλαπλάσιο του 3 και ότι το ένα τρίτο αυτών ισούται με  $\frac{x}{3}$  και αυτά

έχουν αξία  $\frac{2x}{3}$ . Η αξία των χρημάτων που έδωσε την πρώτη μέρα είναι  $\frac{2x}{3}$ , επομένως τη δεύτερη

μέρα του απέμειναν  $\frac{2x}{3} \cdot 2 + 40 - x = 40 + \frac{x}{3}$  ευρώ. Αφού ξόδεψε το 40% αυτών, τη δεύτερη

μέρα ξόδεψε  $\left(40 + \frac{x}{3}\right) \cdot \frac{4}{10} = 16 + \frac{2x}{15}$  ευρώ. Επομένως συνολικά, την πρώτη και τη δεύτερη μέρα

ξόδεψε  $2 \cdot \frac{x}{3} + 16 + \frac{2x}{15} = 16 + \frac{12x}{15}$  ευρώ.

Από την εκφώνηση ξέρουμε τώρα ότι ξόδεψε 40 ευρώ, οπότε

$$16 + \frac{12x}{15} = 40 \Leftrightarrow \frac{12x}{15} = 24 \Leftrightarrow 12x = 360 \Leftrightarrow x = 30.$$

Επομένως είχε αρχικά μαζί του 30 κέρματα των δύο ευρώ και 10 κέρματα του ενός ευρώ με συνολική αξία 70 ευρώ.

## Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

### Πρόβλημα 1.

Να βρείτε την τιμή της παράστασης

$$A = (\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 + \delta^2) - (\alpha\gamma + \beta\delta)^2,$$

αν δίνεται ότι  $\alpha = \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2}$ ,  $\beta = \left(-\frac{1}{2}\right)^3$ ,  $\gamma = -\frac{18}{2^3}$ ,  $\delta = \frac{1}{2^3}$ .

### Λύση

Έχουμε ότι  $\alpha = \left(-\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ ,  $\beta = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$ ,  $\gamma = -\frac{18}{8} = -\frac{9}{4}$ ,  $\delta = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ ,

οπότε θα είναι

$$\alpha^2 + \beta^2 = \left(\frac{9}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{81}{16} + \frac{1}{64} = \frac{325}{64}, \quad \gamma^2 + \delta^2 = \left(-\frac{9}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2 = \frac{81}{16} + \frac{1}{64} = \frac{325}{64},$$

$$\alpha\gamma + \beta\delta = \frac{9}{4} \cdot \left(-\frac{9}{4}\right) + \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot \frac{1}{8} = -\frac{81}{16} - \frac{1}{64} = -\frac{325}{64} \Rightarrow (\alpha\gamma + \beta\delta)^2 = \left(-\frac{325}{64}\right)^2.$$

Άρα έχουμε:  $A = (\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 + \delta^2) - (\alpha\gamma + \beta\delta)^2 = \frac{325}{64} \cdot \frac{325}{64} - \left(-\frac{325}{64}\right)^2 = 0.$

### 2<sup>ος</sup> Τρόπος

$$A = (\alpha^2 + \beta^2)(\gamma^2 + \delta^2) - (\alpha\gamma + \beta\delta)^2 =$$

$$\begin{aligned}
&= \alpha^2\gamma^2 + \alpha^2\delta^2 + \beta^2\gamma^2 + \beta^2\delta^2 - \alpha^2\gamma^2 - 2\alpha\beta\gamma\delta - \beta^2\delta^2 = \\
&= \alpha^2\delta^2 + \beta^2\gamma^2 - 2\alpha\beta\gamma\delta = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2.
\end{aligned}$$

Άρα είναι:

$$A = \left( \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{8} - \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{8} \right)^2 = 0.$$

## Πρόβλημα 2

Μία ομάδα  $\alpha$  εργατών τελειώνει το  $\frac{1}{4}$  ενός έργου στο  $\frac{1}{3}$  μιας ημέρας. Πόσες τέτοιες ομάδες εργατών της ίδιας απόδοσης χρειάζονται για να τελειώσουν 15 ίδια έργα σε 5 ημέρες;

### Λύση

Έχουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

Η μία ομάδα =  $\alpha$  εργάτες τελειώνει το  $\frac{1}{4}$  ενός έργου στο  $\frac{1}{3}$  μιας ημέρας

Πόσοι εργάτες (έστω  $x$ ) τελειώνουν 15 έργα σε 5 ημέρες;

Επειδή τα ποσά: **εργάτες – έργο, είναι ανάλογα**, ενώ τα ποσά: **εργάτες – ημέρες, είναι αντιστρόφως ανάλογα**, έχουμε ότι:

$$x = \alpha \cdot \frac{15}{\frac{1}{4}} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{5} = \alpha \cdot 60 \cdot \frac{1}{15} = 4\alpha.$$

Επομένως θα χρειαστούν 4 τέτοιες ομάδες εργατών.

## Πρόβλημα 3

Θεωρούμε πολυώνυμο  $P(x) = a(x+2)^2 + b(x+3) + c$  όπου οι αριθμοί  $a, b, c$  είναι θετικοί ακέραιοι.

(α) Αν οι αριθμοί  $x, y$  είναι θετικοί ακέραιοι με  $x > y$ , να αποδείξετε ότι ο αριθμός

$\frac{P(x) - P(y)}{x - y}$  είναι θετικός ακέραιος.

(β) Αν ο αριθμός  $P(8)$  είναι πολλαπλάσιο του 3, να αποδείξετε ότι και ο αριθμός  $P(2018)$  είναι πολλαπλάσιο του 3.

### Λύση

(α) Έχουμε ότι

$$P(x) = a(x+2)^2 + b(x+3) + c = ax^2 + (b+4a)x + 4a + 3b + c$$

Επομένως

$$P(x) - P(y) = a(x^2 - y^2) + (b+4a)(x-y) = (x-y)(a(x+y) + b+4a),$$

οπότε

$$\frac{P(x) - P(y)}{x - y} = \frac{(x-y)(a(x+y) + b+4a)}{x - y} = a(x+y) + b+4a$$

που είναι θετικός ακέραιος, αφού οι αριθμοί  $a, b, c, x, y$  είναι θετικοί ακέραιοι.

(β) Από το πρώτο ερώτημα, για  $x = 2018$ ,  $y = 8$  έχουμε ότι

$$\frac{P(2018) - P(8)}{2010} = \kappa \text{ ακέραιος,}$$

δηλαδή

$$P(2018) - P(8) = 2010\kappa, \text{ όπου } \kappa \text{ ακέραιος} \Rightarrow P(2018) = P(8) + 2010\kappa, \text{ όπου } \kappa \text{ ακέραιος}$$

Όμως το  $2010 = 3 \cdot 670$  είναι πολλαπλάσιο του 3, όπως και το  $P(8)$  από την υπόθεση, οπότε και το  $P(2018)$  είναι πολλαπλάσιο του 3.

#### Πρόβλημα 4

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο  $AB\Gamma$  με  $AB = A\Gamma$  και  $\widehat{A} = 72^\circ$ . Ονομάζουμε  $\Delta$  το ίχνος του ύψους από την κορυφή  $\Gamma$  και  $E$  το συμμετρικό του  $A$  ως προς την  $\Gamma\Delta$ . Να αποδείξετε ότι η  $\Gamma E$  περνά από το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $AB\Gamma$ .


**Σημείωση:** Ο περιγεγραμμένος κύκλος ενός τριγώνου είναι ο κύκλος που περνάει από τις τρεις κορυφές του τριγώνου.

#### Λύση

Θεωρούμε το ύψος από την κορυφή  $A$  που τέμνει τη  $\Gamma E$  στο σημείο  $O$ . Θα αποδείξουμε ότι το  $O$  είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου  $AB\Gamma$ , δηλαδή ότι  $OA = OB = OG$ .

Το ύψος από την κορυφή  $A$  είναι και μεσοκάθετος της  $B\Gamma$ , άρα το  $O$  ως σημείο της θα ισαπέχει από τα  $B, \Gamma$ , δηλαδή  $OB = OG$ .

Επιπλέον το  $E$  το συμμετρικό του  $A$  ως προς την  $\Gamma\Delta$ , το τρίγωνο  $A\Gamma E$  είναι ισοσκελές, επομένως  $\widehat{GEA} = 72^\circ$ , οπότε  $\widehat{EGA} = 36^\circ$  (1). Επειδή όμως η  $AO$  είναι ύψος και διχοτόμος, θα ισχύει ότι  $\widehat{OAG} = 36^\circ$ , οπότε λόγω της (1) θα ισχύει  $OA = OG$ .



Σχήμα 2